КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ СВИНЫМ ЦЕПНЕМ?

Забытая паразитарная инфекция, вызываемая *Taenia solium*

Food and Agriculture Organization of the United Nations

WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH

World Health Organization

Лекарства из медицинских учреждений могут вылечить инфекцию ленточными червями.

Используйте туалеты или уборные, чтобы избежать заражения окружающей среды, свиней и других людей.

Мойте руки с мылом и водой после посещения туалета.

Тщательно промывайте овощи или готовьте их перед употреблением.

2

Яйца ленточного червя выделяются с фекалиями. При открытой дефекации (дефекация «на открытом воздухе») окружающая среда (включая овощи и воду) может быть заражена.

Держите свиней в загонах, чтобы избежать их заражения.

1

Тениоз. Ленточные черви живут в кишечнике человека.

3a

Цистицеркоз человека. Проглатывание яиц ленточного червя (из-за несоблюдения правил гигиены после посещения туалета или употребления загрязненной пищи или воды) приводит к развитию цист паразита, главным образом в головном мозге (вызывая судороги и эпилепсию).

3b

Цистицеркоз свиней. У свиней, поедающих яйца ленточных червей (присутствующие в фекалиях или в окружающей среде), развиваются цисты паразитов, главным образом в мышцах (мясе).

Вакцинируйте и лечите свиней, чтобы предотвратить заражение.

4

Зараженное мясо будет содержать цисты паразитов, которые не всегда легко увидеть.

Инспекция мяса может выявить сильно зараженных свиней.

5

Употребление в пищу недожаренной или сырой зараженной свинины приводит к развитию в людях ленточных червей.

Готовьте свинину тщательно (не должно быть видно розового цвета), чтобы убить паразита.

- Цикл передачи инфекции обозначен цифрами
- Меры профилактики и контроля выделены зеленым цветом

Reference number (FAO) CB6278RU
Reference number: OIE/PorkTape/RU/2021/16
Reference number: WHO/UCN/NTD/VVE/2021.8

©FAO, OIE and WHO, 2021. All rights reserved.